



دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانپرستاری

عنوان:

بررسی ارتباط بین رنج معنوی با درد جسمی و سلامت وجودی بیماران مبتلا به

سرطان بستری در بخشهای انکولوژی بیمارستان با هنر در سال ۱۳۹۶

توسط: سمیه بیگی شهربابکی

اساتید راهنما: منصوره عزیززاده فروزی، دکتر طاهره رمضان

استاد مشاور: دکتر بتول تیرگری

۱۳۹۸



بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۰۸

شماره: ۹۸۰۲/۱۶

صورتحلیسه دفاع از پایان نامه

پیوست: .....

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تحصیلات تکمیلی دانشگاه

جلسه دفاعیه پایان نامه خانم سمیه بیگی شهرابکی دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری ورودی ۹۵ تحت عنوان " بررسی ارتباط بین رنج معنوی با درد جسمی و سلامت وجودی بیماران مبتلا به سرطان بستری در بخش آنکولوژی بیمارستان باهنر کرمان در سال ۱۳۹۶" به راهنمایی خانم منصوره عزیززاده فروزی و خانم دکتر طاهره رضانی در ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۶ با حضور اعضای محترم هیات داوران متشکل از:

سمت	نام و نام خانوادگی	امضا
الف : اساتید راهنما	خانم منصوره عزیززاده فروزی خانم دکتر طاهره رضانی	
ب : استاد مشاور	خانم دکتر بتول تیرگری	
ج : عضو هیات داوران (داخلی)	خانم سکینه میری	
د: عضو هیات داوران (خارجی)	خانم دکتر بهناز باقریان	
ه : نماینده تحصیلات تکمیلی	خانم دکتر جمیله فرخ زادیان	

تشکیل گردید و ضمن ارزیابی به شرح پیوست با درجه ..... و نمره ..... ۱۹/۵ ..... مورد تأیید قرار گرفت.

دکتر فیروزه مهرزایی رابر

مهر و امضاء معاون آموزشی دانشکده

## چکیده

**مقدمه و هدف:** ابتلاء به سرطان برای هر فرد تجربه ای غافگیرانه و رنج آور است که بر همه ابعاد وجودی و

سلامتی تاثیر می گذارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین رنج معنوی با درد جسمی و سلامت وجودی بیماران

مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان های وابسته در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۶ می باشد.

**مواد و روش کار:** این مطالعه مقطعی بر روی ۱۴۷ بیمار مبتلا به سرطان بستری در بخش آنکولوژی بیمارستان

باهنر شهر کرمان انجام شد. ابزارهای بررسی درد جسمی Jensen و همکارانش، سلامت وجودی Ellison &

Paloutzian و رنج معنوی Groves & Klauser مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم

افزار SPSS نسخه ۲۱ و با استفاده از آمار توصیفی، فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و امار استنباطی، ضریب

همبستگی پیرسون، t مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه صورت گرفت. سطح معنی داری در این مطالعه کمتر از ۵٪ بود.

**یافته ها:** نتایج نشان داد که ۵۷/۸ درصد شرکت کنندگان زن و ۴۲/۲ درصد مرد و متوسط سن شرکت کنندگان

۴۸ سال بود. از نظر تأهل بیشتر بیماران متأهل (۸۰/۳) بودند. میانگین کل رنج معنوی بیماران برابر با  $۹/۷۶ \pm ۳/۴۷$  در

حد متوسط و میانگین درد جسمی بیماران مورد پژوهش  $۱/۸۹ \pm ۲/۳۳$  در حد خفیف و میانگین سلامت وجودی بیماران

$۳۸/۰۳ \pm ۸/۵۱$  در حد متوسط بود. ارتباط آماری معناداری بین رنج معنوی و درد جسمی ( $p = ۰/۰۱$ ،  $r = ۰/۲$ ) وجود

داشت، بدین معنی که با افزایش رنج معنوی درد جسمی افزایش می یافت. همچنین ارتباط آماری معنی دار معکوسی

بین رنج معنوی و سلامت وجودی وجود داشت، بدین معنی که با افزایش رنج معنوی سلامت وجودی کاهش می یافت

$(p = ۰/۰۰۱$ ،  $r = -۰/۵۸)$ .

**نتیجه گیری:** با توجه به وجود ارتباط معنی دار بین رنج معنوی با درد جسمی و سلامت وجودی به نظر می رسد

توجه به جنبه های غیر جسمی بیماران می تواند بر مشکلات جسمی آنها تاثیر گذار باشد، بنابراین ارائه مراقبت معنوی

باید در الویت مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان قرار گیرد این خود می تواند روند بهبودی را سریعتر و سلامت وی را ارتقاء بخشد.

**واژه های کلیدی:** رنج معنوی، درد جسمی، سلامت وجودی، سلامت معنوی، سرطان

## **Abstract:**

**Introduction:** Cancer is a surprising and painful experience for everyone, affecting all aspects of existential and health. The purpose of this study was to investigate the relationship between spiritual pain and physical pain and existential wellbeing of patients with cancer admitted in affiliated hospitals in Kerman University of Medical Sciences in 2017.

**Methods:** This cross-sectional study was performed on 147 patients with cancer admitted in the oncology department of Bamonar Hospital in Kerman. Physical pain evaluation tools Jensen et al., Ellison & Paloutzian Existential wellbeing and Groves & Klauser Spiritual pain were used. Data were analyzed by SPSS software version 21 using descriptive statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics, Pearson correlation coefficient, independent t-test, one-way ANOVA. The level of meaningful in this study was less than 0/05.

**Results:** Results showed that 57/8% of participants were female and 42/2% were male. The average age of participants was 48 years. Most of the patients were married (80/3). The mean total spiritual pain of patients was  $9.76 \pm 3.47$  in average and the mean of physical pain in patients was  $1.89 \pm 2.33$  mild and the mean of existential wellbeing of patients was  $38.3 \pm 8.51$  in moderate. There was a significant relationship between spiritual pain and physical pain ( $r = 0.2$ ,  $p = 0.01$ ). This means that with increasing spiritual pain, physical pain increased. Also, there was a significant reverse correlation between spiritual pain and existential wellbeing, which existential wellbeing was reduced by increasing the spiritual pain ( $r = -0.58$ ,  $p = 0.001$ ).

**Conclusion:** Attention to the spiritual dimension of patients can be effective in reducing spiritual pain and reduce physical pain and increase the existential wellbeing which is itself part of spiritual well-being. Therefore, spiritual care should be given priority to caring for cancer patients.

**Key words:** Spiritual pain, Physical pain, Existential wellbeing, Spiritual health, Cancer



**Kerman University of Medical Sciences**

**College Nursing and Midwifery Razi**

**In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree M.Sc**

**Title:**

**Study of relationship between spiritual pain with physical pain and existential  
well being of patients with cancer who hospitalized in Oncology's ward in  
Bahonar hospital in Kermani in 2017.**

**BY:**

**Somaye Beygi**

**Supervisor:**

**Mansoor Azizzade Forouzi**

**Dr.Tahereh Ramazani**

**Advisors:**

**Dr.Batool Tirgari**

**2019**